

Fac simile foglietto illustrativo

# TROSYD® U40

## 40% UREA

GIULIANI

### ALTERAZIONI DELLE UNGHIE DA TRAUMI O PSORIASI

- Riduce l'ispessimento della lamina ungueale, favorendone il rinnovo
- Prepara l'unghia al trattamento con farmaci, anche in caso di onicomicosi

#### **ALTERAZIONI DELLE UNGHIE**

La lamina ungueale può subire delle modificazioni a causa di eventi traumatici o psoriasi. Si tratta di malformazioni delle unghie che possono portare a delle variazioni della struttura dell'unghia nella colorazione (variazioni dal giallo al grigio opaco), superficie (perdita di uniformità) e spessore (variabile).

Le modifiche della lamina ungueale possono non essere legate a traumi o psoriasi ma essere correlate alla presenza di un fungo (onicomicosi). L'unghia colpita pur continuando a crescere, può presentare alterazioni del colore, della struttura (ispessimento, fragilità fino alla rottura della lamina ungueale) e della forma.

#### **TROSYD® U40 A BASE DI UREA AL 40% PER USO TOPICO**

Trosyd® U40, gel fluido da 10 ml

Prodotto a base di Urea al 40% per uso topico.

Gel fluido trasparente contenuto in una

bacchetta dotata di beccuccio erogatore con tappo a chiusura ermetica.

Trosyd® U40, grazie alla proprietà cheratolitiche dell'Urea ad alta concentrazione ed all'innovativa modalità d'erogazione, **è indicato nei casi di alterazione della lamina ungueale da traumi o psoriasi.**

L'utilizzo del prodotto infatti rimuovendo la cheratina in superficie permette di levigare l'unghia e di diminuirne lo spessore, favorendo il rinnovo della lamina ungueale.

Trosyd® U40 può essere utilizzato anche per preparare l'unghia ai trattamenti con farmaci antimicotici topici.

L'Urea al 40% permette un maggior assorbimento del farmaco, migliorando i tempi di guarigione.

Spesso infatti l'unghia, in particolare quella dell'alluce, rappresenta una barriera compatta per la penetrazione del farmaco.

L'utilizzo dell'Urea rimuove la cheratina in superficie, rendendo l'unghia più permeabile e favorendo al tempo stesso il rinnovo della lamina ungueale.

---

## **MODALITÀ D'USO**

Si consiglia una applicazione alla sera, alternando cicli di 15 giorni di trattamento a cicli di 15 giorni di sospensione.

**Alterazioni delle unghie da traumi o psoriasi:** si consigliano 2 mesi di trattamento.

**Preparazione dell'unghia al trattamento con farmaci antimicotici topici:** si consiglia di applicare il prodotto per tutto il periodo di trattamento con il farmaco, seguendo i cicli di 15 giorni di utilizzo e 15 giorni di sospensione. L'applicazione del farmaco deve essere successiva a quella di Trosyd® U40 e deve avvenire quando quest'ultimo si è totalmente asciugato.

Trosyd® U40 si applica facilmente sulle unghie, la particolare forma della bacchetta erogatrice permette una facile ed omogenea applicazione del gel.

Durante l'uso non bisogna premere la bacchetta erogatrice, il contenuto fuoriesce al semplice contatto con la superficie da trattare.

## **AVVERTENZE**

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 12 anni.

L'utilizzo per periodi prolungati dell'Urea alla concentrazione del 40% può portare all'ablazione dell'unghia.

La presenza di cristalli bianchi all'interno del tappo, dovuti alla cristallizzazione dell'Urea, è normale e non pregiudica la validità del prodotto.

Non applicare sulle mucose e sulla cute.

Evitare il contatto con gli occhi, risciacquare accuratamente in caso di contatto oculare accidentale.

Conservare a temperatura ambiente. Prodotto per uso esterno.

Non utilizzare oltre la data riportata sulla confezione.

## **INGREDIENTI**

Aqua, Urea, Propylene glycol, Sodium polyacrylate.

## **FABBRICANTE**

Giuliani S.p.A.  
Via P. Palagi, 2  
20129 Milano

USO ESTERNO

DISPOSITIVO MEDICO

