

TROSYD®

الالتهابات الفطرية والبكتيرية للأظافر

28% محلول للجلد للاستخدام مع الأظافر

تيوكونازول

اقرأ كامل محتوى هذه النشرة باتتياه قبل استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك. استخدم هذا الدواء دائماً بالطريقة المذكورة في هذه النشرة أو حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلي.

- احتفظ بهذه النشرة الداخلية. قد تحتاج إلى قراءتها من جديد في المستقبل.
- إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات أو النصائح، اسأل الصيدلي.
- إذا ما أصبت بأي من الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك الأعراض غير المدرجة في هذه النشرة، توجه إلى طبيبك أو الصيدلي. انظر الفقرة 4.
- توجه إلى طبيبك إذا لم تلاحظ أي تحسن أو إذا لاحظت تفاقم الأعراض بعد فترة قصيرة من العلاج.

محتويات هذه النشرة:

1. ما هو الدواء TROSYD وفيما يُستخدم
2. ماذا عليك أن تعرف قبل البدء في استخدام TROSYD
3. كيفية استخدام TROSYD
4. الأعراض الجانبية المحتملة غير المرغوب فيها
5. كيفية حفظ TROSYD
6. محتوى علبة الدواء ومعلومات أخرى

1. ما هو الدواء TROSYD وفيما يُستخدم

يحتوي TROSYD على مادة التيوكونازول الفعالة المضادة للفطريات والتي تُستخدم لعلاج التهابات الأظافر التي تسببها الفطريات مثل:

- فطر الأظافر الناتج عن الفطريات الجلدية والخمائر • التهابات الأظافر المختلطة بسبب النشاط المتزامن المضاد للبكتيريا (ضد البكتيريا). اتصل بطبيبك إذا لم تلاحظ أي تحسن أو إذا ما لاحظت تفاقم الأعراض بعد فترة قصيرة من العلاج.

2. ماذا عليك أن تعرف قبل البدء في استخدام TROSYD

لا تستخدم TROSYD

- إذا كنت تعاني من حساسية (شديدة الحساسية) للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
- أثناء الحمل (انظر فقرة "الحمل والرضاعة").

تحذيرات واحتياطات: استشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام TROSYD.

يمكن أن يؤدي استخدام الأدوية الموضعية، خاصة لفترة طويلة، إلى ظهور أعراض الحساسية (فرط الحساسية).

الأطفال والمراهقون: لا توجد بيانات مؤكدة حول سلامة وفعالية TROSYD مع الأطفال والمراهقين، استشر الطبيب.

الأدوية الأخرى وTROSYD: أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أية أدوية أخرى. لا توجد تفاعلات معروفة مع أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة: إذا كنتِ حاملاً، أو مرضعة، أو تعتقدين أنك حامل، أو تخططين لإنجاب طفل، اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل استخدام هذا الدواء.

لا تستخدم TROSYD أثناء الحمل لأنه يمكن أن يستمر العلاج لعدة أشهر حتى وإن كان امتصاص الدواء بعد وضعه على الأظافر ضئيلاً.

قيادة المركبات واستعمال الآلات: لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير للدواء TROSYD على القدرة على القيادة واستعمال الآلات.

3. كيفية استخدام TROSYD: استخدم هذا الدواء دائمًا بالطريقة المذكورة في هذه النشرة أو حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلي. إذا ما كانت لديك أية شكوك أو استفسارات، استشر طبيبك أو الصيدلي. ضع TROSYD على الأظافر المصابة وفي المنطقة المحيطة بالأظافر (حول الظفر) مرتين في اليوم صباحًا ومساءً مع استخدام الفرشاة المعدة خصيصًا لذلك والمرفقة بالغطاء. المذيب الموجود في TROSYD يجف في غضون 5 دقائق ليترك طبقة حماية رقيقة شفافة وزيتية على الأظافر. وحتى لو تم إزالة هذه الطبقة الرقيقة عرضيًا عن طريق الخطأ فإن ذلك لن يقلل من فاعلية هذا الدواء. يُنصح بعدم استخدام ضمادات تسبب الانسداد.

تحذير: لا تتجاوز الجرعات المحددة دون استشارة طبية. تختلف مدة العلاج المطلوبة لتحقيق الشفاء من مريض لآخر اعتمادًا على العامل المسبب للعدوى ومدى اتساع الإصابة. وبشكل عام يمكن للعلاج أن يستمر في المتوسط حتى 6 أشهر، ولكن يمكن إطالة هذه المدة حتى تصل إلى عام كامل.

عند استخدامك لدواء TROSYD أكثر مما ينبغي: لم يتم الإبلاغ عن حالات استخدام جرعة زائدة. في حالة الابتلاع/التناول العرضي لدواء TROSYD، استشر طبيبك على الفور أو اذهب إلى أقرب مستشفى. إذا كان لديك أية استفسارات حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية المحتملة غير المرغوب فيها

هذا الدواء، مثله مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب أعراضًا جانبية غير مرغوب فيها على الرغم من عدم حدوث هذه الأعراض الجانبية لدى الجميع.

أعراض جانبية نادرة جدًا (قد تظهر لدى حتى مريض واحد من بين 10000 مريض). التهاب موضعي خفيف وعابر للجلد. في حالة وجود أعراض حساسية (فرط الحساسية) يجب بالضرورة التوقف عن استخدام هذا الدواء والبحث عن علاج آخر مناسب. إن الامتثال للإرشادات الواردة في هذه النشرة الداخلية يقلل من خطر حدوث أعراض جانبية غير مرغوب فيها.

التبليغ عن الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها: إذا ما ظهرت لديك أي من الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك الأعراض غير المدرجة في هذه النشرة، توجه إلى طبيبك أو الصيدلي. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها مباشرةً عبر نظام الإبلاغ الوطني على عنوان الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

يمكنك بهذا الإبلاغ عن الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيفية حفظ TROSYD

احفظ هذا الدواء بعيدًا عن أنظار الأطفال ومتناول أيديهم. لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر المعني. لا يحتاج هذا الدواء إلى أية شروط خاصة لحفظه. لا تتخلص من أي دواء عن طريق سكبته أو إلقائه في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية العادية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. هذا الأمر سوف يساعد في حماية البيئة. من المهم أن تكون المعلومات الخاصة بهذا الدواء متاحة في جميع الأوقات، لذلك احتفظ بكل من علبة الدواء والنشرة الداخلية.

6. محتوى علبة الدواء ومعلومات أخرى

ما يحتوي TROSYD

100 جرام من المحلول تحتوي على:

المادة الفعالة: التيوكونازول 28 جرام

مكونات أخرى: حمض الوندسيلينك، أسيتات الإيثيل.

وصف شكل TROSYD وما هي محتويات العبوة

محلول للجلد.

قارورة تحتوي على 12 مل من محلول جلدي للاستخدام على الأظافر بنسبة 28%.

الجهة صاحبة التصريح بطرح هذا الدواء في الأسواق

Giuliani S.p.A. - Via Palagi, 2 - 20129 Milano

الشركة المنتجة

Doppel Farmaceutici - via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

تم تحديث هذه النشرة الداخلية في فبراير 2016