

TROSYD®

皮肤真菌和细菌感染

1%霜剂

1%皮肤粉剂

1%皮肤乳剂

噻康唑

在使用本药品之前,请仔细阅读本说明书,因为它含有对您重要的信息。

一定要严格按照本说明书中的描述或医生或药剂师的指示使用此药。

- 保留本说明书。您可能会有需要对其重新阅读。
- 如果您需要更多的信息或建议,请向药剂师咨询。
- 如果您遇到任何副作用,包括本说明书中没有列出的副作用,请咨询医生或药剂师。参见第4点。
- 如果没有发现病状改善,或在短期治疗后发现病状恶化,请联系医生。

本说明书的内容:

1. TROSYD是什么,有哪些用途
2. 使用TROSYD前需要了解的事项
3. 如何使用TROSYD
4. 可能出现的副作用
5. 如何存放TROSYD
6. 包装内容和其他信息

1.TROSYD是什么,有哪些用途

TROSYD包含的活性成分为噻康唑,是一种抗真菌药物,用于治疗真菌引起的皮肤感染,如:

- 由皮肤真菌、酵母菌和其他对噻康唑敏感的真菌引起的皮肤病
- 由对药物敏感的革兰氏阳性细菌引起的皮肤感染
- 由于同时存在的抗真菌和抗菌活性,导致混合性皮肤感染。

如果没有发现病状改善,或在短期治疗后发现病状恶化,请联系医生。

2.使用TROSYD前需要了解的事项

如果您对本药的活性成分或第6点所列出的任何其他成分过敏(超敏),请勿使用TROSYD。

警告和注意事项

使用TROSYD前请咨询医生或药剂师。

局部外用膏,尤其长时间使用,可能会引起过敏(超敏反应)。

儿童和青少年

目前还没有关于TROSYD对儿童和青少年的安全性和有效性的数据,请向医生咨询。

其他药物和TROSYD

如果您正在服用、最近服用或可能服用任何其他药物,请告诉您的医生或药剂师。与其他药物没有已知的相互作用。

怀孕和母乳喂养

如果您正在怀孕、疑似怀孕或计划怀孕、或正在哺乳,请在使用此药前征求医生或药剂师的意见。

如果您正处于孕期或母乳喂养期间,请仅在咨询医生并与其一起评估该情况下的风险/收益比后,再使用TROSYD。

驾驶车辆和操作机器

尚未有TROSYD对驾驶车辆和操作机器的能力产生影响的报告。

TROSYD 1%乳膏和1%乳剂含有鲸蜡硬脂醇(也称为十六十八醇鲸蜡硬脂醇)。可能引起局部皮肤反应(例如接触性皮炎)。

TROSYD 1%皮肤乳剂含有丙二醇。可能引起皮肤刺激。

3.如何使用TROSYD

一定要严格按照本说明书的规定或医生或药剂师的指示使用本药。

如有任何疑问,请咨询医生或药剂师。

每天两次(早晚各一次),将薄薄一层药膏轻柔地涂抹至患处及其周围的皮肤上。

警告:在没有医疗建议的情况下,请勿超过指定剂量。

TROSYD 1%霜剂:将药物轻柔地涂抹至患处及其周围的皮肤上。

在擦烂(皮肤褶皱)区域,应少量使用药物,并充分涂抹以避免浸渍。

TROSYD 1%皮肤粉剂:该药品装在容器中,可以直接在患处及其周围的皮肤上均匀涂抹一层。

TROSYD 1%皮肤乳剂:用指尖或棉签轻轻按摩,涂抹患处皮肤和周围皮肤。

实现康复所需的治疗时间因人而异,这取决于感染源和感染部位。

- **花斑癣**(一种真菌感染,表现为淡咖啡色斑点,通常位于躯干部位):7天的治疗时长通常足以使大多数病人获得治愈。
- **足癣**(脚气):可能需要长达6周的治疗,特别是对慢性角化过度(皮肤增厚)的临床变种。
- **其他部位(身体、皮肤皱褶)霉菌病,念珠菌病和红斑狼疮(细菌感染)**:需要的治疗时间通常在2到4周之间。

如果疾病反复发生,或者您注意到其特征最近发生任何变化,请咨询医生。

如果您的TROSYD使用量超出预期

目前还没有过量使用的报告。如果不慎吞下/服用TROSYD,请立即告诉医生或前去最近的医院。

如果对该药物的使用有任何疑问,请问医生或药剂师。

4.可能出现的副作用

如同所有药物,该药可能会引起副作用,但不是所有的人都会出现这种情况。

非常罕见的副作用(可能影响到1/10,000名患者)

轻度和暂时性的局部皮肤刺激。

如果发生过敏(超敏反应),应停止使用并进行适当的治疗。

遵循说明书上的指示可以减少副作用的风险。

副作用报告

如果您遇到任何副作用,包括本说明书中未列出的副作用,请联系医生或药剂师。

您也可以通过网址:www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili,将副作用直接报告给国家报告系统。

通过报告副作用,您可以帮助提供更多关于此药安全性的信息。

5.如何存放TROSYD

请将此药放在儿童看不见和够不着的地方。

包装上注明的有效期结束后,请勿使用此药。

到期日期是指该月的最后一天。

不需要特别的储存预防措施。

请勿通过废水系统或生活垃圾处理任何药物。

询问药剂师如何处理不再使用的药品。这将有助于保护环境。

始终保持有关于药物的信息很重要,因此请保留包装盒和说明书。

6.包装内容和其他信息

TROSYD包含什么

TROSYD 1%霜剂

1克霜剂含有:

有效成分:噻康唑:10毫克

其他成分:聚山梨醇酯-60,山梨醇酐硬脂酸酯,鲸蜡硬脂醇,2-辛基十二烷醇,鲸蜡基酯蜡,苯甲醇,纯净水。

TROSYD 1%皮肤粉剂

100克粉剂含有:

有效成分:噻康唑:1克

其他成分:滑石粉,肉豆蔻酸镁,高岭土,沉淀二氧化硅。

TROSYD 1%皮肤乳剂

100克乳剂含有:

有效成分:噻康唑:1克

其他成分:乳化蜡,鲸蜡醇,鲸蜡硬脂醇,椰子油,甘油硬脂酸酯和棕榈酸酯,丙二醇,苯甲醇,纯净水。

TROSYD的外观和包装内容的描述

TROSYD 1%霜剂

霜剂。30克管装。

TROSYD 1%皮肤粉剂

皮肤粉剂。30克瓶装。

TROSYD 1%皮肤乳剂

皮肤乳剂30克瓶装。

销售授权持有者

Giuliani S.p.A. Via Palagi, 2 - 20129, Milano

霜剂制造商

Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Martiri Delle Foibe, 1- 29016 Cortemaggiore (PC)

皮肤粉剂和乳剂制造商

Haupt Pharma Latina S.r.l. S.S. 156, Km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina)

本说明书于2016年2月更新