

说明书：给使用者的信息

TROSYD[®]

真菌性和细菌性指甲感染

28% 指甲用皮肤溶液
噻康唑

在使用本药之前，请仔细阅读本说明书，因为它包含了对您重要的信息。请务必按照本说明书的描述或医生或药剂师的指示使用本药。

- 保留本说明书。您可能会有需要对其重新阅读。
- 如果您需要更多的信息或建议，请向药剂师咨询。
- 如果您遇到任何副作用，包括本说明书中没有列出的副作用，请咨询医生或药剂师。见第4点。
- 如果没有发现病状改善，或在短期治疗后发现病状恶化，请联系医生。

本说明书的内容：

1. TROSYD是什么，有哪些用途
2. 使用TROSYD前需要了解的事项
3. 如何使用TROSYD
4. 可能出现的副作用
5. 如何存放TROSYD
6. 包装内容和其他信息

1. TROSYD是什么，有哪些用途

TROSYD含有活性成分噻康唑，是一种抗真菌药物，用于治疗由真菌引起的指甲感染，如：

- 由皮肤真菌和酵母菌引起的甲癣
- 由于同时具有抗菌（针对细菌）活性，导致的混合性指甲感染。如果没有发现病状改善，或在短期治疗后发现病状恶化，请联系医生。

2. 使用TROSYD前需要了解的事项

- 如果您对本药的活性成分或第6点所列出的任何其他成分过敏（超敏），请勿使用TROSYD。
- 怀孕期间（请参阅“怀孕和母乳喂养”部分）。

警告和注意事项：使用TROSYD前请咨询医生或药剂师。

局部外用软膏，尤其长时间使用，可能会引起过敏（超敏反应）。

儿童和青少年：目前还没有关于TROSYD对儿童和青少年的安全性和有效性的数据，请向医生咨询。

其他药物和TROSYD：如果您正在服用、最近服用或可能服用任何其他药物，请告诉您的医生或药剂师。与其他药物没有已知的相互作用。

怀孕和母乳喂养：如果您正在怀孕、疑似怀孕或计划怀孕、或正在哺乳，请在使用此药前征求医生或药剂师的意见。

怀孕期间请勿使用TROSYD，因为虽然涂抹在指甲上后药物的吸收可以忽略不计，但治疗仍可能会持续数月。

驾驶车辆和操作机器： 尚未有TROSYD对驾驶车辆和操作机器的能力产生影响的报告。

3. 如何使用TROSYD

一定要严格按照本说明书的规定或医生或药剂师的指示使用本药。如有任何疑问，请咨询医生或药剂师。

使用附在盖子上的专用小刷，将TROSYD涂抹在受感染的指甲和甲廓区域（指甲周围），每天2次，早晚各一次。TROSYD所含的溶剂可在5分钟内干燥，留下一层透明的油性薄膜。即使这层薄膜被意外去除，也不会削弱药物的活性。建议不要使用闭塞性绷带。

警告：在没有医生建议的情况下，请勿超过指定剂量。实现治愈所需的治疗时间因患者而异，并与感染源和病变程度有关。通常情况下，治疗平均时间可能持续6个月，但可能延长到一年。

如果您的TROSYD使用量超出预期：目前还没有过量使用的报告。如果不慎吞下/服用TROSYD，请立即告诉医生或前去最近的医院。如果对该药物的使用有任何疑问，请询问医生或药剂师。

4. 可能出现的副作用

如同所有药物，该药可能会引起副作用，但不是所有的人都会出现这种情况。

非常罕见的副作用（可能影响到1/10,000名患者）

轻度和暂时性的局部皮肤刺激。如果发生过敏（超敏反应），应停止使用并进行适当的治疗。遵循说明书上的指示可以减少副作用的风险。

副作用报告：如果您遇到任何副作用，包括本说明书中未列出的副作用，请联系医生或药剂师。

您也可以通过网址：www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili，将副作用直接报告给国家报告系统。

通过报告副作用，您可以帮助提供更多关于此药安全性的信息。

5. 如何存放TROSYD

请将此药放在儿童看不见和够不着的地方。包装上注明的有效期结束后，请勿使用此药。到期日期是指该月的最后一天。该药不需要任何特殊的储存条件。请勿通过废水系统或生活垃圾处理任何药物。询问药剂师如何处理不再使用的药品。这将有助于保护环境。始终保持有关于药物的信息很重要，因此请保留包装盒和说明书。

6. 包装内容和其他信息

TROSYD包含什么

100克溶液中包含：

有效成分：噻康唑 28克

其他成分：十一碳烯酸，乙酸乙酯。

TROSYD的外观和包装内容的描述 皮肤溶液。

小瓶装12毫升皮肤溶液，供指甲使用，浓度28%。

销售授权持有者

Giuliani S.p.A. - Via Palagi, 2 - 20129 Milano

制造商

Doppel Farmaceutici - via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

本说明书于2016年2月更新