

TROSYD®

皮肤的真菌和细菌感染

1% 霜剂
1% 皮肤粉剂
1% 皮肤乳剂

噻康唑

在使用本药品之前，请仔细阅读本说明书，因为它含有对您重要的信息。

一定要严格按照本说明书中的描述或医生或药剂师的指示使用此药。

- 保留本说明书。您可能会有需要对其重新阅读。
- 如果您需要更多的信息或建议，请向药剂师咨询。
- 如果您遇到任何副作用，包括本说明书中没有列出的副作用，请咨询医生或药剂师。参见第4点。
- 如果没有发现病状改善，或在短期治疗后发现病状恶化，请联系医生。

本说明书的内容：

1. TROSYD是什么，有哪些用途
2. 使用TROSYD前需要了解的事项
3. 如何使用TROSYD
4. 可能出现的副作用
5. 如何存放TROSYD
6. 包装内容和其他信息

1. TROSYD是什么，有哪些用途

TROSYD包含的活性成分为噻康唑，是一种抗真菌药物，用于治疗真菌引起的皮肤感染，如：

- 由皮肤真菌、酵母菌和其他对噻康唑敏感的真菌引起的皮肤病
- 由对药物敏感的革兰氏阳性细菌引起的皮肤感染
- 由于同时存在的抗真菌和抗菌活性，导致混合性皮肤感染。

如果没有发现病状改善，或在短期治疗后发现病状恶化，请联系医生。

2. 使用TROSYD前需要了解的事项

请勿使用TROSYD

如果您对本药的活性成分或第6点所列出的任何其他成分过敏（超敏）。

警告和注意事项

使用TROSYD前请咨询医生或药剂师。

局部外用药膏，尤其长时间使用，可能会引起过敏（超敏反应）。

儿童和青少年

目前还没有关于TROSYD对儿童和青少年的安全性和有效性的数据，请向医生咨询。

其他药物和TROSYD

如果您正在服用、最近服用或可能服用任何其他药物，请告诉您的医生或药剂师。与其他药物没有已知的相互作用。

怀孕和母乳喂养

如果您正在怀孕、疑似怀孕或计划怀孕、或正在哺乳，请在使用此药前征求医生或药剂师的意见。

如果您正处于孕期或母乳喂养期间，请仅在咨询医生并与他一起评估该情况下的风险/收益比后，再使用TROSYD。

驾驶车辆和操作机器

尚未有TROSYD对驾驶车辆和操作机器的能力产生影响的报告。

TROSYD 1% 乳膏和1%皮肤乳剂含有鲸蜡硬脂醇（也称为十六十八醇鲸蜡硬脂醇）。

可能引起局部皮肤反应（例如接触性皮炎）。

TROSYD 1% 皮肤乳剂在每2.5克乳液中含175毫克丙二醇，相当于70毫克/克。丙二醇可能引起皮肤刺激感。

TROSYD 1% 乳膏和1%皮肤乳剂在每2.5克产品中含25毫克苯甲醇，相当于10毫克/克。苯甲醇可能引起过敏反应，并造成局部轻微刺激感。

3. 如何使用TROSYD

一定要严格按照本说明书的规定或医生或药剂师的指示使用本药。如有任何疑问，请咨询医生或药剂师。每天两次（早晚各一次），将薄薄一层药膏轻柔地涂抹至患处及其周围的皮肤上。

警告：在没有医疗建议的情况下，请勿超过指定剂量。

TROSYD 1%乳膏：将药物涂抹在受真菌感染的皮肤表面和紧邻周围区域，并轻轻按摩，皮肤表面无毛为佳。在糜烂（皮肤褶皱）区域，应少量使用药物，并充分涂抹以避免浸渍。

TROSYD 1%皮肤粉剂：该药品装在容器中，可以直接在患处及其周围的皮肤上均匀涂抹一层。在治疗脚癣时，必须将粉剂涂抹在受真菌病影响的皮肤、周围皮肤表面以及与脚接触的表面，包括袜子和鞋子的内侧。

TROSYD 1%皮肤乳剂:用指尖或棉签将药物涂抹在真菌感染的皮肤表面以及周围区域并轻轻按摩,包括毛发覆盖的区域。

实现康复所需的治疗时间因人而异,这取决于感染源和感染部位。

- 花斑癣(一种真菌感染,表现为淡咖啡色斑点,通常位于躯干部位):7天的治疗时长通常足以使大多数病人获得治愈。
- 足癣(脚气):可能需要长达6周的治疗,特别是对慢性角化过度(皮肤增厚)的临床变种。
- 其他部位(身体、皮肤皱褶) 霉菌病,念珠菌病和红斑狼疮(细菌感染):需要的治疗时间通常在2到4周之间。

如果疾病反复发生,或者您注意到其特征最近发生任何变化,请咨询医生。

如果您的TROSYD使用量超出预期

目前还没有过量使用的报告。

如果不慎吞下/服用TROSYD,请立即告诉医生或前去最近的医院。如果对该药物的使用有任何疑问,请询问医生或药剂师。

4.可能出现的副作用

如同所有药物,该药可能会引起副作用,但不是所有的人都会出现这种情况。

非常罕见的副作用(可能影响到1/10,000名患者)

轻度和暂时性的局部皮肤刺激。

如果发生过敏(超敏反应),应停止使用并进行适当的治疗。

遵循说明书上的指示可以减少副作用的风险。

副作用报告

如果您遇到任何副作用,包括本说明书中未列出的副作用,请联系医生或药剂师。您还可以通过网络“<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>”上的国家报告系统直接报告副作用。通过报告副作用,您可以帮助提供更多关于此药安全性的信息。

5.如何存放TROSYD

请将此药放在儿童看不见和够不着的地方。

包装上注明的有效期结束后,请勿使用此药。

到期日期是指该月的最后一天。

不需要特别的储存预防措施。

请勿通过废水系统或生活垃圾处理任何药物。询问药剂师如何处理不再使用的药品。这将有助于保护环境。

始终保持有关于药物的信息很重要,因此请保留包装盒和说明书。

6.包装内容和其他信息

TROSYD包含什么

TROSYD 1%霜剂

1克霜剂含有:

有效成分:噻康唑:10毫克

其他成分:聚山梨醇酯-60,山梨醇酐硬脂酸酯,鲸蜡硬脂醇,2-辛基十二烷醇,鲸蜡基酯蜡,苯甲醇,纯净水。

TROSYD 1%皮肤粉剂

100克粉剂含有:

有效成分:噻康唑:1g

其他成分:滑石粉,肉豆蔻酸镁,高岭土,沉淀二氧化硅。

TROSYD 1%皮肤乳剂

100克乳剂含有:

有效成分:噻康唑:1g

其他成分:乳化蜡,鲸蜡醇,鲸蜡硬脂醇,椰子油,甘油硬脂酸酯和棕榈酸酯,丙二醇(E1520),苯甲醇,纯净水。

TROSYD的外观和包装内容的描述

TROSYD 1%霜剂

霜剂。30克管装。

TROSYD 1%皮肤粉剂

皮肤粉剂。30克瓶装。

TROSYD 1%皮肤乳剂

皮肤乳剂30克瓶装。

销售授权持有者

Giuliani S.p.A. - Via Palagi, 2 - 20129 Milano

霜剂制造商

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Martiri Delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

粉剂制造商

Haupt Pharma Latina S.r.l. - S.S. 156, Km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina)

皮肤乳剂制造商

Farmol Health Care S.r.l. - Via del Maglio, 6 - 23868 Valmadrera (Lecco) - Italia

此说明书于2023年3月更新