

1% بخاخ للجلد، محلول

تيوكونازول

اقرأ كامل محتوى هذه النشرة بانتباه قبل استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.
استخدم هذا الدواء دائماً كما هو موصوف في هذه النشرة أو كما يخبرك طبيبك أو الصيدلي.
احتفظ بهذه النشرة الداخلية. قد تحتاج إلى قراءتها من جديد في المستقبل.
إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات أو النصائح، اسأل الصيدلي.

• إذا ما أصبت بأي من الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك الأعراض غير المدرجة في هذه النشرة، توجه إلى طبيبك أو الصيدلي. انظر فقرة 4.
• توجه إلى طبيبك إذا لم تلاحظ أي تحسن أو ما إذا لاحظت تفاقم الأعراض بعد فترة قصيرة من العلاج.
محتويات هذه النشرة:

1. ما هو الدواء TROSYD وفيما يُستخدم

2. ماذا عليك أن تعرف قبل البدء في استخدام TROSYD

3. كيفية استخدام TROSYD

4. الأعراض الجانبية المحتملة غير المرغوب فيها

5. كيفية حفظ TROSYD

6. محتوى علبة الدواء ومعلومات أخرى

1. ما هو الدواء TROSYD وفيما يُستخدم

يحتوي TROSYD على المادة الفعالة تيوكونازول وهي مضادة للفطريات ومستخدمة لعلاج عدوى الجلد الناتجة من الفطريات مثل:
• داء الفطريات الناجم عن القوباء الحلقية والخمائر والفطريات الأخرى الحساسة للتيوكونازول
• العدوى الجلدية المختلطة بسبب النشاط المتزامن المضاد للفطريات (ضد الفطريات) والمضاد للبكتيريا (ضد البكتيريا).
توجه إلى طبيبك إذا لم تلاحظ أي تحسن أو إذا لاحظت تفاقم الأعراض بعد فترة قصيرة من العلاج.

2. ماذا عليك أن تعرف قبل البدء في استخدام TROSYD

لا تستخدم TROSYD

إذا كنت تعاني من حساسية (شديدة الحساسية) للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

تحذيرات واحتياطات

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام TROSYD.

يمكن أن يؤدي استخدام الأدوية الموضعية، خاصة لفترة طويلة، إلى ظهور أعراض الحساسية (فرط الحساسية).

تجنب رش هذا الدواء في العينين.

الأطفال والمراهقون

لا توجد بيانات تتعلق بفعالية وفعالية TROSYD على الأطفال والمراهقين، استشر الطبيب.

الأدوية الأخرى وTROSYD

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أية أدوية أخرى. لا توجد تفاعلات معروفة مع أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة

إذا كنتِ حاملاً، أو مرضعة، أو تتعديدين أنك حامل، أو تخططين لإنجاب طفل، اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل استخدام هذا الدواء. إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة لا تستخدم TROSYD إلا بعد استشارة طبيبك وتقييم نسبة المخاطر/الفوائد في حالتكِ.

قيادة المركبات واستخدام الآلات

لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير للدواء TROSYD على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

3. كيفية استخدام TROSYD

استخدم هذا الدواء دائماً بالطريقة المذكورة في هذه النشرة أو حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلي. إذا ما كانت لديك أية شكوك أو استفسارات، استشر طبيبك أو الصيدلي.

ضع الدواء مرتين في اليوم (مرة في الصباح ومرة في المساء) مع رشه بالتساوي على المنطقة المراد علاجها. TROSYD 1% بخاخ للجلد، محلول مفيد في علاج مناطق الجلد المغطاة بالشعر وفي ثنايا طبقات الجلد. كما يمكن استعماله لتسهيل الاستخدام على أسطح الجلد المصابة بالفطريات بالجذع مثل الظهر والبطن والصدر. يمكن استخدامه أيضًا والأسطوانة المقلوبة. تحذير: لا تتجاوز الجرعات المحددة دون استشارة طبية.

تختلف مدة العلاج المطلوبة لتحقيق الشفاء من مريض لآخر اعتمادًا على العامل المسبب للعدوى ومكان الإصابة.

• النخالية المبرقشة (عدوى فطرية تظهر على شكل بقع نمش بلون قهوة الحليب، وتحدث بشكل عام على الجذع): العلاج لمدة 7 أيام وهذه المدة عادة ما تكون كافية لتحقيق الشفاء لدى معظم المرضى.

• سعفة القدم (القدم الرياضي): قد تُلزم حتى 6 أسابيع من العلاج خاصة فيمَر يتعلق بالتنوع السريري لفرط التقرن المزمن (زيادة سمك الجلد).

• العدوى الفطرية في أماكن أخرى (الجسم، ثنايا الجلد) داء المبيضات والإريترانما (عدوى بكتيرية): مدة العلاج المطلوب عادة ما تكون بين 2 و4 أسابيع.

استشر طبيبك إذا تكرر التهاب الجلد أو إذا ما لاحظت أي تغييرات حديثة في خصائص الجلد.

عند استخدامك لدواء TROSYD أكثر مما ينبغي

لم يتم الإبلاغ عن حالات استخدام جرعة زائدة. في حالة الابتلاع/التناول العرضي لدواء TROSYD، استشر طبيبك على الفور أو اذهب إلى أقرب مستشفى. إذا كان لديك أية استفسارات حول استخدام هذا الدواء، أسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية المحتملة غير المرغوب فيها

هذا الدواء، مثله مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب أعراضًا جانبية غير مرغوب فيها على الرغم من عدم حدوث هذه الأعراض الجانبية لدى الجميع.

أعراض جانبية نادرة جدًا (قد تظهر لدى حتى مريض واحد من بين 10000 مريض).

التهاب موضعي خفيف وعابر للجلد. في حالة وجود أعراض حساسية (فرط الحساسية) يجب بالضروري التوقف عن استخدام هذا الدواء والبحث عن علاج آخر مناسب. إن الامتثال للإرشادات الواردة في هذه النشرة الداخلية يقلل من خطر حدوث أعراض جانبية غير مرغوب فيها.

التبليغ عن الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها

إذا ما ظهرت لديك أي من الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك الأعراض غير المدرجة في هذه النشرة، توجه إلى طبيبك أو الصيدلي. كما يمكنك

الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر نظام الإبلاغ الوطني على العنوان

المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء. <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. يمكنك بهذا الإبلاغ عن الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها

المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيفية حفظ TROSYD

احفظ هذا الدواء بعيدًا عن أنظار الأطفال ومتناول أيديهم.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر المعني.

لا يحتاج هذا الدواء إلى أية شروط خاصة لحفظه.

لا تتخلص من أي دواء عن طريق سبكه أو إلقائه في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية العادية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها.

هذا الأمر سوف يساعد في حماية البيئة.

من المهم أن تكون المعلومات الخاصة بهذا الدواء متاحة في جميع الأوقات، لذلك احتفظ بكل من علبة الدواء والنشرة الداخلية.

6. محتوى علبة الدواء ومعلومات أخرى

ما يحتوي TROSYD

1 جرام من محلول بخاخ الجلد:

المادة الفعالة: التيبوكونازول: 10 ملجم

مكونات أخرى: أيزوبروبيل ميريستات، كحول الأيزوبروبيل

وصف شكل TROSYD وما هي محتويات العبوة

بخاخ للجلد، محلول.

تحتوي زجاجة البخاخ على 30 جرام من المحلول 1%

الجهة صاحبة التصريح بطرح هذا الدواء في الأسواق

Giuliani S.p.A. Via Palagi, 2 - 20129, Milano

الشركة المنتجة

Zellaerosol GmbH, Wiesenstrasse 13, D-79669 Zell in Wiesental (Germany)

تم تحديث هذه النشرة في مارس 2023